Акция #ДобраяСуббота

Флешмоб #ВместеСЗаботой

#МЫВМЕСТЕ

Волонтеры медики
Всероссийское общественное движение

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

«Большая перемена» запускает флешмоб #ВместеСЗаботой – вместе с друзьями-волонтёрами общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе **именно ты можешь оказать помощь в вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Прими участие и проинформируй своих близких о важности защиты своего иммунитета.**

Если хочешь защитить своих близких – познакомься с основными вопросами, которые помогут тебе рассказать своим родным и друзьям об основных правилах вакцинации, ведь, как говорится: «Кто владеет информацией – тот владеет миром».

И не забывайте, что развёрнутую информацию о здоровье или рекомендации может предоставить только врач!

Зачем нужна вакцинация?

Вакцинация обеспечивает формирование иммунитета, который помогает защитить организм от заболевания.

Можно ли заболеть коронавирусом, если я сделал вакцину?

Вакцина не дает защиты от вируса на 100 процентов, однако вероятность заболеть в разгар пандемии у привитых будет значительно меньше. А в случае заражения болезнь будет протекать в легкой форме.

Можно ли проводить вакцинацию после 60 лет?

Лица старше 60 лет подвержены наибольшему риску заражения коронавирусом, в связи с чем в этом возрасте рекомендуется пройти вакцинацию. Вакцинация возможна после консультации с врачом.

Какие есть противопоказания к вакцинации?

- аллергия на какой-либо компонент вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты;
- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
- обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии).

Почему она делается 2 раза?

Есть разные виды вирусов. В состав I компонента вакцины входит один вид, в состав II компонента другой. Таким образом для организма снижается вирусная нагрузка.

Какие подтверждающие документы мне дадут после прививки? Что с ними делать?

Факт применения вакцины на I и II этапах подтверждается внесением информации в единую государственную информационную системы здравоохранения. Также данные о вакцинации заносятся в сертификат прививок, при его отсутствии его Вам заведут.

Что делать, если у меня появятся побочные эффекты?

Появление перечисленных побочных эффектов допустимо и может развиться у любого человека. В случае, если побочные эффекты чрезмерно выражены и беспокоят Вас, необходимо обратиться к врачу.

Могу ли я не носить маску после прививки?

Вакцина против COVID-19 не отменяет для привитого пациента необходимость носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

Какие последствия отказа от вакцинации?

Никаких последствий, это добровольно

Это обязательно или нет?

Вакцинирование – добровольная процедура, которая происходит с вашего согласия

Кому можно проводить вакцинацию?

Вакцинации подлежат лица, не болевшие COVID-19 и не имеющие антител к коронавирусу по результатам лабораторных исследований, которые не имеют противопоказаний к вакцинации.

Если я переболел недавно, нужно ли делать прививку?

Вакцинации подлежат лица, не болевшие COVID-19 и не имеющие антител к коронавирусу по результатам лабораторных исследований.

Как производится вакцинация?

Вакцинация проводится в II этапа. Перед проведением II этапа вакцинации проводится повторный осмотр врачом.

Перед проведением вакцинации Вас осмотрит врач и даст заключение о том, можно или нельзя Вам делать прививку. Врач расскажет Вам о возможных реакциях на вакцинацию и поможет заполнить информированное добровольное согласие на проведение вакцинации.

Через какое время после I этапа вакцинации производится II этап?

Период между I и II этапом вакцинации составляет 21 день. В случае, если Вы пропускаете срок второй вакцинации, можно пройти II этап и через 35 дней, но лучше этот вопрос не затягивать – снижается эффективность от вакцинации.

Побочные эффекты

После вакцинации в первые-вторые сутки могут развиваться и кратковременные общие (непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, болью в суставах и мышцах, общей слабостью и недомоганием, головной болью) и местные (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отёчность) реакции. Как правило, они проходят в течение 3 последующих дней. Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда – увеличение регионарных лимфоузлов. Возможно развитие аллергических реакций.

Как долго держится иммунитет?

Длительность иммунитета зависит от индивидуальных особенностей организма, по прогнозам разработчиков вакцины длительность иммунитета составляет порядка 2 лет.

Могу ли я заразить человека коронавирусом, если сделал прививку?

От того, что человек получил прививку, он не становится заразным и не может заразить окружающих.